

Alti e bassi

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 17:35

D : Buonasera Prof Bolli, è da un pò che leggo le sue preziose risposte su "Porta

Ho 42 anni, altezza 1.75 peso 74 Kg, da sei anni ho il diabete di tipo 2. Prima curato con ipoglicemizzan

Purtroppo però così non riesco più ad avere una glicemia con valori accettabili.

Da tre settimane sto prendendo la Lantus prima di coricarmi 10 ui e sto facendo 8 ui di Novorapid a pran

Con il diabetologo allora abbiamo ridotto la rapida a 7 ui a pranzo e 5 a cena con le stesse 10 ui di lantu

I risultati però sono analoghi. Spesso alta la glicemia al mattino 150/230, la stessa anche a pranzo e po

Ho paura delle ipoglicemie e non capisco perchè i valori non si mantengano stabili ma scendano sempre

La domanda che le pongo è: è possibile che la Lantus per me non vada bene oppure che assunta insier

Come posso ovviare a ciò cercando però di avere glicemie "stabili" sempre sui 130? Forse dovrei ritorna

Con la vecchia terapia di rado avevo le ipoglicemie con questa invece quasi ogni giono.

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrà dedicare alla mia mail e per i suoi consigli tanto u

Grazie

G. L.

Alti e bassi

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 17:35

R : caro sig. L.

non abbia paura, se le cose non vanno bene vuol dire che i farmaci non usati nel modo giusto.

Il mio consiglio: forse Lei dovrebbe fare metformina a dose più elevata (Glucophage 1000, 1 c x2 al dì) L
Le dosi vanno aggiustate, è difficile per me darLe le unità, ma il concetto è:

-aumenti lantus di +2 U e la inietti ore 20 circa

-Novorapid ne deve fare qualche unità alla 1° colazione, a pranzo si regoli Lei sulla base della glicemia

Mi faccia sapere ed eventualmente mi viene a trovare a Perugia

cari saluti

Prof. Geremia B. Bolli
Department of Internal Medicine, Endocrinology
and Metabolism
University of Perugia

Alti e bassi

Scritto da Geremia Bolli

Venerdì 27 Febbraio 2009 17:35
