

Rialzo glicemico post-prandiale

Scritto da Alberto Davalli
Martedì 28 Luglio 2009 15:15

D : Vorrei porre una domanda: Da che cosa dipende il rialzo glicemico post-prandiale? Sono diabetico tipo 1. La mia terapia consiste da 3 anni in una dose serale di Lantus e di Humalog ai pasti.

Faccio un esempio: al mattino, prima di colazione posso avere una glicemia "buona" di 120-130. Faccio

E' logico che questi sbalzi sono veramente uno stress insopportabile e la variazione delle dosi di Humalog. Se osservo il mio diario con misurazione dopo 2 ore dai pasti, esso è decente, ma se lo osservo ad un'ora

R. M.

R : La ragione di quanto così dettagliatamente descritto dipende dal fatto che l'insulina endogena. Inoltre, fisiologicamente l'insulina secreta dal pancreas è rilasciata a livello della vena porta e raggiunge il fegato. L'insulina iniettata sottocute entra invece nel circolo generale e solo secondariamente tramite questo giugino. Con i mezzi disponibili non è possibile risolvere questo problema, si può provare anticipando di qualche

Comunque, gli studi epidemiologici che hanno valutato lo sviluppo delle complicanze in relazione al controllo

Dr Alberto M. Davalli
Diabetologo - Endocrinologo
Istituto San Raffaele
Milano