

In pazienti con diabete 2 con macroalbuminuria - cioè un livello eccessivo nelle urine di una proteina che

L'eliminazione di carne rossa dalla dieta "potrebbe rappresentare un ulteriore strumento terapeutico nell

Già in precedenza, il Dott. Gross e colleghi della Universidade Federal do Rio Grande do Sul in Porto A

In uno studio più recente, i ricercatori hanno studiato 17 pazienti con diabete 2 con macroalbuminuria ch

Il team, in un articolo riportato sull'American Journal of Clinical Nutrition, ha determinato che il tasso di es

Tre soggetti (17,6 %) dopo la dieta a base di pollo e otto soggetti (47,1 %) dopo la dieta a basso conten

Le riduzioni indotte dalla dieta nell'albumina urinaria in pazienti che già avevano disfunzioni renali da dia

Le diete a base di pollo e a basso contenuto proteico hanno anche mostrato migliori livelli di colesterolo  
Ciò dimostra che l'eliminazione della carne rossa dalla dieta può abbassare il maggior rischio di decess

I livelli di zuccheri nel sangue e della pressione sono risultati per lo più non modificati dalle diete.  
Il peso dei pazienti non è cambiato con la dieta abituale o con quella a base di pollo, ma è risultato infer

(Reuters Health)

American Journal of Clinical Nutrition, maggio 2006.

4 giugno 2006